

*Li. de Venarum
sectione.
C. li. 3. de Ad-
mi. sectione.*

*Axillaris in
brachio consi-
stentis series.*

*Præcipua ax-
illaris in duos
truncos divi-
sio.*

amplitudine interdum æquales, nonnunquam uerò una cæteris ampliori. ° Prima (quam fre-
quentissimè, ac potissimum in hominibus deesse reperies) penitus obliqua deorsum ad me-
dium flexus cubiti articuli deferitur, atque sub ° musculorum secundos tertiosque digitorum
articulos flectentium, hincq; ab humero & ulna originem fumentium capitibus in aliquot ra-
mos digesta cessat. non autem uti Galenus scribit, alicui axillaris uenæ ramo (quemadmodum
° ea quam nunc persequar) commiscetur. Vt enim Galenum axillaris uenæ portionem sub mu-
sculis reconditam minus rectè descripsisse obseruabis, ita etiam primæ huius humerariæ pro-
paginis (si quando hæc unquam cernitur) seriem non est assequutus. Vti sanè admodum con-
cinnè uereq; eas descripsit uenas, quæ citra sectionem in nudato, ut in uenæ sectione fit, brachio
plurimum & frequenter illi occurrunt. ° Secundus itaq; humerariæ ramus, quem cum alijs
duobus paulo supra cubiti articulum deriuat, cæteris plerunq; crassior existit, & obliquus
quoque sub cute ad cubiti cum humero articuli flexus medium descendit, ac cum axillaris ue-
næ ° ramo, quem postmodum commemorabo, coit, ° unaq; ex ambobus ramis, humerariæ ni-
mirum & axillaris uena conflatur. ° Tertius humerariæ ramus, ° musculū qui radio iuxta bra-
chiale insertus, radij in supinū motus autor est, conscendit: & paulatim deorsum prorēps, obli-
quus per radium iuxta medium ipsius longitudinis in externam cubiti regionem perferitur,
quam ubi attingit, ut in reliquo super commemoratum nuper musculum ductū, ° furculos quos-
dam in proximam sibi cutem depromit, quorum non ° infimus esse solet, qui ab ipso educi-
tur, quæ humeraria in tres illos ramos iuxta externum humeri tuberculum diffunditur. Cæ-
terum tertius hic ramus sensim oblique uersus ulnæ appendicem, brachialisque radicem
prorēps, tandem ° alteri cuiuspiam inibi ° commiscetur uenæ, hæc que adauctus externam
brachialis sedem conscendit, & in aliquot furculos errabundo ductu sparfos dissectus, regionē
intercurrit, quæ ante paruum digitum & anularem habetur, externa etiam illorum digitorum
sede soboles quasdā sibi uendicante. Cuius uerò uenæ propago illa demū sit, quam tertio hume-
rariæ ramo uniti iam scripsimus, subiungam, ubi primum aliquot axillaris uenæ propagines
absolucro, quippe ab axillaris ramo sub cute per totam ulnæ longitudinem exporrecto, illius
propaginis initium pendet. Axillaris itaque, ° quum primum axillam superat, brachiumque
subingreditur, inter musculos brachij os amplexantes delitescit, præcipuè uerò inter antero-
rem sedem ° primi seu interioris cubiti extendentis, & posteriorem sedem tendinis ° muscu-
li, quo brachium pectori admouetur, & dein iuxta cubitum flectentium musculorum ° poste-
riorem. Hæc primum capitibus ° musculorum, quorum ope cubitus extenditur ° propagi-
nem offert, illis ° uenulis e regione ductam, quæ ab axillari in glandulas hic repositas dige-
runtur. Post hæc, sed demissius, ex posteriori ipsius sede ° uenam ipsam musculis dispensat, a
qua mediocris etiam magnitudinis soboles in externæ brachij sedis cutem disseminantur. Ab
externo latere axillaris uenæ, ° alia notatu dignæ amplitudinis propago diffunditur, oblique
deorsum sub humero ad ° externum usque ipsius tuberculum descendens, ac sub ° musculus cu-
bitum extendentibus occultata, ° musculorumq; capitibus ab externo humeri tuberculo prona-
scentibus, ramulos quosdam exhibens, ac demum aliquosq; in externam cubiti sedem prope-
pens, simul cum ° neruo quem brachium petentium opportunè quartum enumerabo. Has pro-
pagines axillaris adhuc in alto latitans edit, ipsaq; in ° duos truncos diffunditur, quos sanè ac-
curatissimè examinatos uelim. non tantum Galeni nomine, quem hæc axillaris diuisio latuit,
sed eorum quoq; qui se operæ precium aliquod in Anatome arbitrantur præstitisse, dum sectio-
nem semel atque iterum aggressi, simul cum axillari uena humerariam porrigi, se animadu-
tisse scribunt, oscitanter humerariam (quæ etiam uel ante sectionem notissima esse debuit) unā
cum carnea membrana à brachio auferentes, & postmodum ° alteram axillaris uenæ partem
(quam modò persequar) humerariæ loco describentes. Axillaris itaq; hominis uena non pro-
cul ab ipsius thoracis cavitare in axillam egressu, in duos quodammodo pares diffunditur
truncos, quorum alter interius atq; in profundo toto ductu submergitur, ac ° arteriæ in ma-
num exporrectæ perpetuò attentus, eadem ferè cum ea distributionis serie digeritur, simul etiā
° neruo brachium adeuntium tertio concomitatus. Inter ° duos enim cubiti flectentes mu-
sculos deorsum ad mediam sedem flexus articuli cubiti porrigitur, illis musculis, & dein mem-
branis quibus nerui induuntur ramulos spargens. Quando autem cubiti articulum supera-
uit, atq; inter musculos digitorum flexus autores in alto reconditus ferri incipit, in ° duos diri-
mitur ramos, qui modicè ab inuicem recedentes, ac musculos quos perreptant furculis impli-
cantes, unā cum tendinibus internā summæ manus sedē petunt, qui per ° ligamentū in interna
brachialis regione anuli modo conspicuum porriguntur. Rami inibi in alias soboles partiti
sub ° tendine feruntur, qui latescens uolæ cuti subnascitur, atque hinc ita in internam digito-

rum sedem digeruntur, ut binæ soboles pollicis, & totidē
ramo qui secundum radiū per cubitū porrigitur. Ab i
soboles anulari, & minimo, & una medio exhibentur, a
qui externam uolæ sedem occupant, atq; ita ab altero ra
tinent, qui primo pollicis ossi connascuntur. In hunc igit
nusquam prodit, totusq; in altis & delitescentibus sedib
ex alto ad internæ brachij sedis cutem emergit, uersus hu
ac ante sectionem sub media cubiti longitudinis sede no
tum conspicua. Vbi autem anteriori tuberculo humer
li sedem paulo elatius quàm cubiti cum humero articulu
pemodum æquales partitur uenas, quarum anterior c
nes præsentis trunci soboles) oblique deorsum ad medi
cum ° secundo humerariæ ramo ad humiliorē median
bi ex ambabus confurgit uena, quam communem, quia
merito appellamus. uulgus tamen medianam uocat, etia
mos qui hanc communem efformant, medias & obliqu
uena huius axillaris iuxta interioris humeri tuberculum b
inferioris cubiti sedis cuti & interioris itidem exterioris
nā sitarū regionū cuti inter præcipuos ramos huc excur
dem, ad exteriora tamē magis declinans, uersus brachial
merariæ ° ramo huc contendenti ° coitēs, simul cū illo, ut
illo humerariæ ramo deficiente, ea axillaris uenæ propago
nu gerit. Præter hunc ramum posterioris illius axillaris
adit, qua posterior cubiti articuli sedes induitur, atq; is ra
dū procul perreptat. Verum alij etiā ° rami ab ° hac pos
digeruntur, qui uario & admodū incerto implexu permi
illo ° ramo quæ ulnæ exporrigi dicebā a fumentes, aliosq;
furculis & propaginibus in eum modū per cubiti interi
cedit non contemnenda, quæ axillaris uenæ ° ramus com
mans, ab humiliori sede & ex medio ductu emittit. Hæc
terdū uerò errabundo ductu perferitur, alijsq; huius sedi
graciles sunt uariæq; inuicē implicantur, ut interna cubiti
uenter seu fura uarietibus molestetur. Propagines hæc
sed partim oblique, partim rectā, partim uerò transuer
dorsus diremptæ, totam summæ manus internam cu
natæ, ac inter cutem carneamque membranam confi
que pollicis radicem, seu Veneris, aut ut alijs uisum
tim id sibi uendicant, quod ipsis ° ramus ab illis uenis °
in externam pollicis regionem diffundi iam dicturus
atque ° duabus illis axillaris & humerariæ propaginib
citur, ad elatiorē cubiti sedem paulatim contendens,
longitudinis medium hinc inde transcendat: neque
fundens, & interdum aliunde ab interna cubiti sede ali
cubiti sedem peruenit, perpetuò cuti substrata. Vbi i
e. mediam radij appendicis sedem accedit, ° supra radiū
li articulum, in ° duos ramos communis uena diffund
corum ° (non autem °) alij uerò ° Y & ° A etiam referr
ramus, qui elatior est, ° portiunculam ad internam br
dispensat, quæ dictis nuper hanc sedem perreptantibu
rò elatioris ramū reliquum est, exterius inter pollicem &
1. uarias soboles inuicem aliquando unitas, aliquando aut
ter ramus qui inferius ° aut ° Y caput constituit, indic
sedem petens, in uarias quoque soboles exhauritur. C
nus cutem series adeo uaria est, pugnansque, ut hanc
ferim quum inter quamplurimos homines uix duos
in ramos propagine inuenias, adde eiusdem hominis d
gruere. Operæ precium itaq; fuerit, uenarum in manu